

## AVES DEPOSITADAS NO CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES DO IBAMA NO ESTADO DA PARAÍBA, BRASIL<sup>1</sup>

Isales Santos de Alexandria Pagano<sup>1</sup>, Antônio Emanuel Barreto Alves de Sousa<sup>2</sup>, Paulo Guilherme Carniel Wagner<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Graduando em Ciências Biológicas da Universidade Federal da Paraíba, email: isalespagano@hotmail.com; <sup>2</sup>Analista Ambiental do CEMAVE/IBAMA; <sup>3</sup>Analista Ambiental do IBAMA/SUPES/PB.

O tráfico de animais silvestres vem sendo um importante fator de redução da biodiversidade no Brasil, contribuindo com uma retirada anual de cerca de 38 milhões de espécimes silvestres da natureza. O índice de mortalidade dos espécimes capturados chega a 90% devido às más condições de captura e transporte. Objetivando identificar quais as aves mais visadas para o comércio ilegal no estado da Paraíba, foram analisadas, identificadas e quantificadas as aves depositadas no Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA na Paraíba (CETAS-IBAMA/PB) no período de agosto de 2006 a julho de 2007. Durante esse período, foram depositadas 2.283 aves (88% do total de animais depositados), compreendendo 105 espécies, 33 famílias e 15 ordens. Dentre as aves depositadas, 84% resultaram de apreensão, 9% de entrega voluntária e 7% de resgate. Predominaram indivíduos da ordem Passeriformes (79%), da família Emberizidae (55%) e do gênero *Sporophila* (32%). Essa predominância também é observada no âmbito nacional, o que demonstra a preferência por espécimes desses táxons. As espécies galo-de-campina *Paroaria dominicana* (n=214), canário-da-terra *Sicalis flaveola* (n=212), golado *Sporophila albogularis* (n=227), caboclinho *Sporophila bouvreuil* (n=135), papa-capim *Sporophila nigricollis* (n=269), e azulão *Cyanocompsa brissonii* (n=159) compreenderam cerca de 53% do total de aves depositadas. Nos municípios de João Pessoa (n=615), Campina Grande (n=471) e Guarabira (n=242) ocorreram as maiores apreensões. A presença de espécies como a marianinha-de-cabeça-amarela *Pionites leucogaster*, o cardeal *Paroaria coronata*, o anumará *Curaeus forbesi*, dentre outras, sugere importação de aves de outros estados e regiões. Também foram registradas três espécies ameaçadas de extinção, o pintassilgo-do-nordeste *Carduelis yarrellii*, o anumará *C. forbesi* e a arara-azul-grande *Anodorhynchus hyacinthinus*, além de 8 espécies endêmicas da caatinga, que inclui as já citadas *P. dominicana* e *S. albogularis*, as quais estão entre as mais apreendidas.

**Palavras-chave:** CETAS-PB, Paraíba, Tráfico de aves.

**Órgão financiador:** PIBIC/CNPq.

---

<sup>1</sup> Projeto desenvolvido junto ao Centro Nacional de Pesquisa para Conservação das Aves Silvestres (CEMAVE)