

OBSERVAÇÃO DE ANILHAS COLORIDAS E CENSO DE CHARADRIIDAE, SCOLOPACIDAE E LARIDAE NA COROA DO AVIÃO, IGARASSU, PERNAMBUCO

Pedro Jorge Brainer de Carvalho, João Luiz Xavier do Nascimento
Centro Nacional de Pesquisa para a Conservação das Aves Silvestres

O Brasil abriga o terceiro maior número de aves limícolas neárticas encontradas no continente americano, sendo a maior parte migrantes do hemisfério Norte, destacando-se *Pluvialis squatarola*, *Charadrius semipalmatus*, *Calidris alba* e *Areneria interpres*. O estudo foi realizado na Coroa do Avião (7° 40'S e 34° 50'W), ilha localizada no litoral Norte de Pernambuco, entre os meses agosto de 2005 e julho de 2006 com duração de quatro dias ao mês. O local é considerado sítio de invernada e área de complementação do ciclo biológico dessas aves. Esta pesquisa objetivou a recuperação de anilhas coloridas e o censo dos indivíduos através da contagem direta com auxílio de binóculo e luneta. Os resultados indicaram a presença de 12 espécies da ordem Charadriiformes, distribuídas em três famílias. Foi encontrado um pico populacional de *C. semipalmatus* em abril; *A. interpres*, *Calidris pusilla*, *Thalasseus sandvicensis* e *Charadrius collaris* em outubro e *C. alba* em fevereiro. Quanto a constância, foram consideradas constantes *P. squatarola*, *C. semipalmatus*, *A. interpres*, *C. pusilla*, *C. alba*, *Sterna hirundo* e *T. sandvicensis* e foram consideradas acidentais *Calidris fuscicollis*, *Limnodromus griseus*, *Numenius phaeopus* e *Calidris canutus*. Com relação à frequência a espécie *C. alba* foi classificada como muito freqüente nos meses de janeiro e de fevereiro e freqüente nos outros meses, a espécie *C. semipalmatus* foi classificada como freqüente em março e abril e pouco freqüente nos meses anteriores. As demais espécies são pouco freqüentes. Com relação às anilhas coloridas foram observados sete indivíduos marcados, um *A. interpres* em 04/11/2005, cinco *C. alba*, um em 07/01/2006 e quatro em 15/02/2006 e um *P. squatarola* em 26/03/2006. Os cinco exemplares da espécie *C. alba* apresentaram bandeirola verde na tíbia esquerda, cor que indica os Estados Unidos como local de anilhamento, e as outras duas espécies apresentaram bandeirola azul anilhadas no Brasil. A realização de censos e monitoramentos é fundamental para acompanhar a variação do número de indivíduos e suas rotas migratórias. Sendo assim, a continuidade de trabalhos é de extrema importância para conservação dessas aves e de seus locais de invernada.

Palavras chave: Monitoramento, aves e migração.