

PRESAS E PREDADORES EM COLÔNIAS DE ARRIBAÇÃS *ZENAIIDA AURICULATA* (AVES, COLUMBIDAE) NO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO

Elivan Arantes de Souza
CEMAVE/IBAMA, elivan.souza@ibama.gov.br

A *Zenaida auriculata*, distribui-se da América Central a Terra do Fogo de forma descontínua. Para reproduzir forma colônias de milhares de indivíduos. No semi-árido nordestino, constrói seus ninhos entre as plantas mais espinhosas e urticantes da Caatinga. A dinâmica reprodutiva da espécie apresenta grande interação com outros grupos faunísticos visitantes ou residentes na região, nessas interações ecológicas constatou-se a presença de: mamíferos, aves, répteis e invertebrados. Dados do CEMAVE obtidos desde 1984 confirmam esta ligação sistêmica entre procriação da arribaçã e a fauna da Caatinga. Em 2001, objetivando dar continuidade aos estudos comportamentais da espécie, realizou-se duas expedições à fazenda Sítio município de Acauã - Piauí. A partir da observação direta ou vestígios (fezes, pegadas, odores) de alguns animais (mamíferos, aves, répteis, insetos etc) na área, registrou-se a presença de algumas espécies que, tradicionalmente, utilizam as colônias de procriações em busca de alimentos. Assim, elaborou-se uma lista comparativa entre as espécies citadas na literatura e as observadas nessa área reprodutiva. Concluiu-se que a dinâmica de um pombal, dada sua intensidade contínua, interfere de forma positiva nos processos ecológicos da Caatinga. Foi possível aferir também, uma mudança significativa na composição das comunidades de predadores, pois algumas espécies, como: *Harpia harpya*, *Puma concolor* entre outros, já não são registradas nas áreas de pombal. Em contrapartida, verificou-se uma forte presença de espécies não citadas anteriormente como: *Elanus leucurus*, *Coragyps atratus* etc.

Palavras chaves: Predação, Caatinga, Reprodução.

Órgão financiador: IBAMA/CEMAVE www.ibama.gov.br/cemave